

シンガポールの予防接種スケジュール

	年齢	生 不 活 化	出	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			生 時	か 月	か 月	か 月	か 月	か 月	か 月	か 月	か 月	か 月	か 月	か 月	か 月	か 月	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳
定期 接 種	結核 BCG	生	1回目	出生直後から1歳までに1回接種																							
	B型肝炎 Hepatitis B	不活化	1回目	2回目						3回目	出生直後から 3回(0, 1, 6ヶ月後)																
	三種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風) DPT	不活化			DTaP I期 1回目 2回目 3回目					1期: 生後2カ月以降 4~6週間隔で3回							DTaP 追加 1回目 18ヶ月								TdaP 追加 2回目 10-11歳		
	ポリオ/ IPV不活化(注射)OPV生(経口) Poliomyelitis	不活化 生			IPV I期 1回目 2回目 3回目					1期: 生後2カ月以降 1か月間隔で3回							IPV 追加 1回目 18ヶ月					IPV 追加 2回目 6歳~				OPV 追加 2回目 10-11歳	
	麻疹・風疹・おたふくかぜ MMR	生														1回目 12~15ヶ月 2回目 15~18ヶ月											
	任意 接 種	ロタウイルス (経口) Rotavirus	生		初回: 6週~14週					2回目: 14~24週 (16週までに終了が望ましい)																	
	肺炎球菌 13価 Pneumococcus 13	不活化		6週目以降から 4~8週間隔で3回												追加 1回	接種を開始する年齢により必要な接種回数が異なります。 詳細は別紙予防接種一覧表を参照										
	Hib Haemophilus influenzae type B (Hib)	不活化			1回目	2回目	3回目									追加 1回 18ヶ月	接種を開始する年齢により必要な接種回数が異なります。 詳細は別紙予防接種一覧表を参照										
	水痘 Varicella (Chickenpox)	生														12か月~18ヶ月に 3ヶ月あけて2回接種が望ましい									13歳以上は、6週間 あけて、2回接種		
	麻疹・風疹・おたふくかぜ・水痘 MMRV	生														1回目 12~15ヶ月 2回目 15~18ヶ月									13歳以上は、6週間 あけて、2回接種		
	A型肝炎 Hepatitis A	不活化														1回目: 1歳以降 2回目: 6~12ヶ月後											
	インフルエンザ Influenza	不活化									生後6カ月以降	前年の接種履歴により1回または2回															
	ヒトパピローウイルス(子宮頸がん) HPV	不活化																							9歳以降 3回 製品により異なります。		

接種後多い副反応は？

局所反応；接種部位の発赤、腫脹、硬結、痛みなど 全身症状：発熱、倦怠感など
副反応が起きたら？

局所の腫れや、熱感が強い場合には冷やしてください。
腫れやかゆみが強い場合には、アレルギーを抑えるお薬が有効な場合もあります。
発熱：通常の発熱時と同様に、解熱剤を使用して構いません。
ぐったりする、嘔吐、2日以上続く高熱などがあつたら医師に連絡しましょう。

ワクチン接種後、次の接種までの間隔

生ワクチンの後は4週間、
不活化ワクチンの後は1週間
それぞれあけて、次のワクチンを接種します。
* 不活化ワクチンと生ワクチンを接種する必要がある時は、不活化ワクチン
から接種すると1週間で2種類が接種できます。
* 複数のワクチンを同じ日に接種することも可能です。

