

ワクチン	種類 *1	対象年齢	接種の方法 と 回数 *2	次のワクチン 接種との間隔
結核 BCG	生	出生直後から	1回	4週間以上
三種混合 (ジフテリア・百日咳・破傷風) DPT	不	4歳以上	追加接種 2回目に使用: 10-11歳 接種の可否、時期などをご相談下さい。	1週間以上
五種混合 (DPT+ポリオ+ヒブ)	不	2ヶ月から	1期:生後2ヵ月以降 3回 4-6週間隔 追加接種1回目: 1歳半から2歳ごろ (1期終了後1年から1年半)	
六種混合 (DPT+ポリオ+ヒブ+B型肝炎)	不	2ヶ月から	追加接種2回目: 10-11歳 接種の可否、時期などをご相談下さい。	
ポリオ (注射 IPV・経口 OPV) Polio	不(注射) 生(経口)	2ヶ月から	3回 (0, 1, 2月) 追加接種1回目:1歳半 2回目:6-7歳 3回目:10-11歳	不1週間以上 生4週間以上
MMR (麻疹・おたふくかぜ・風疹)	生	1歳から	1回目:12~15ヶ月 1回 2回目:15~18ヶ月 1回 (1回目から3~6か月以上空けて2回目)	4週間以上
水痘 Varicella (Chickenpox)	生	12ヵ月~18ヵ月 13歳以上	3ヶ月以上空けて2回接種。2回目の接種 を18ヶ月までに終了 6週間空けて2回接種	4週間以上
ロタウイルス(経口) Rotavirus	生	6週-24週	2回 初回 週齢6-14週 2回目 週齢14-24週	4週間以上
肺炎球菌 13価 Pneumococcus 13	不	6週-6ヶ月に開始	3回 (0, 1, 2月) 追加接種1回(月齢12-15ヶ月)	1週間以上
		7~11ヶ月に開始	2回 (0, 1月) 追加接種2歳までに1回	
		12~23ヶ月に開始	2回 (0, 2月)	
		2~5歳での接種	1回	

*1 不:不活化ワクチン 生:生ワクチン

*2 接種回数の見方: 例、3回(0, 1, 6月) 初回を0とし、初回から1ヶ月後、初回から6ヵ月後

ワクチン	種類 *1	対象年齢	接種の方法 と 回数 *2	次のワクチン 接種との間隔
ヒブ Haemophilus influenzae type B (Hib)	不	6週-6ヶ月未満	3回(0, 1, 2月) 追加接種 月齢15-18ヶ月の間に1回	1週間以上
		6ヶ月以上-1歳未満	2回(0, 1月) 追加接種1回(2歳までに)	
		1歳以上-5歳	1回	
インフルエンザ Influenza	不	6ヶ月から	1回 または 2回 前年の接種歴による	1週間以上
破傷風 Tetanus	不		4-8週間隔で2回 6-18ヶ月後に1回	1週間以上
A型肝炎 Hepatitis A	不	1歳以上	2回(0, 6-12月)	1週間以上
B型肝炎 Hepatitis B	不	出生直後から	3回(0, 1, 6月)	1週間以上
A型B型肝炎混合ワクチン HEP A & HEP B	不	1~16歳未満	2回(0, 6月)	1週間以上
		16歳以上	3回(0, 1, 6月)	
日本脳炎 Japanese Encephalitis	不	2ヶ月から	2回(0, 1月) 追加接種 流行地域に滞在する場合 1年後以降に1回	1週間以上
狂犬病 Rabies	不	狂犬病常在地への渡 航者	3回(0, 1, 3-4週間) 追加接種 必要時2-5年毎	1週間以上
腸チフス Typhoid	不	2歳以上	1回(3年間有効)	1週間以上
ヒトパピローマウイルス Human Papillomavirus (HPV)	不	9~26歳の女性 推奨11~12歳	3回(0, 1, 6月)または2回(0, 6月)	1週間以上

*1 不:不活化ワクチン 生:生ワクチン

*2 接種回数の見方: 例、3回(0, 1, 6月) 初回を0とし、初回から1ヶ月後、初回から6ヶ月後